

Ein neuer Onthophagus von den Philippinen (Col. Scarab.)

Von G. Frey

Onthophagus tragus n. sp.

Schwarz, mäßig glänzend, Seiten des Halsschildes und der hintere Seitenrand der Flügeldecken fein hellgrau behaart. Die Unterseite und das Pygidium zerstreut mit abstehenden, hellgrauen kurzen Haaren bekleidet.

♂ Clypeus parabolisch, nur vorne kurz aufgebogen und abgestutzt, die Ecken abgerundet, ♀ kürzer, gleichmäßig gerundet, vorne gerade abgestutzt, und mäßig, auch auf den Seiten aufgebogen. Stirnleiste ♂ sehr schwach, wenig gebogen und die Wangennähte nicht erreichend. ♀ etwas höher und länger. Scheitel ♂ mit 2 flachen konischen parallelen Hörnern, welche nur durch eine sehr schwache Leiste verbunden sind. Die Hörner sind unmittelbar neben dem inneren Augenrand und an der Basis etwas breiter als dieser. Scheitel ♀ mit einer hohen und geraden Leiste in der Höhe der Mitte der Augen. Die Oberseite des Kopfes ist beim ♂ nur auf den Seiten und am aufgebogenen Teil des Clypeus sehr fein und zerstreut punktiert, sonst glatt (x 25), beim ♀ ist der Clypeus fein quer rugos, die Wangen sind sehr fein und zerstreut punktiert, der Zwischenraum der Leisten kaum punktiert, ebenso die Leisten selbst nur mit ein paar kaum sichtbaren äußerst zerstreuten Punkten.

♂♀ Der Halsschild ist auf der Scheibe fein und auf den Seiten etwas gröber mäßig dicht punktiert. Vorderer Seitenrand nur vorne etwas eingebogen, Vorderecken fast rechtwinkelig abgerundet und etwas vorgezogen. Hinterer Seitenrand deutlich geschweift, Hinterecken obsolet. Basis fein gerandet, Absturz einfach, hinter den Hörnern beim ♂ etwas steiler. Flügeldecken mit ziemlich engen Streifen, dieselben sind sehr fein gekerbt, die flachen Zwischenräume sind auf der Scheibe sehr fein, auf den Seiten etwas dichter und gröber punktiert. Der 7. Flügeldeckenstreifen deutlich gekrümmt. Das Pygidium ist gerandet, der Vorderrand bildet einen flachen Winkel, seine Oberfläche ist ziemlich dicht und grob punktiert. Vordertibien mit 4 Zähnen, der 1. Flügeldeckenzwischenraum an der Basis ohne Höcker. Länge 6–7 mm. 2 ♂♂ 2 ♀♀ Mindanao, Lanao, Kolobugan W. Schultze, Philippinen. Holotype und Allotype im Museum Dresden, Paratypen in meinem Museum. Die Art steht sehr nahe dem *Onth. tragoides* Bouc., ist aber wie folgt verschieden. ♂ *tragoides* Bouc.: ausgerandeten Clypeus, Punktierung auf dem Hals-

schild und Flügeldecken gleichmäßig, *triginus* n. sp. ♂ Clypeus parabolisch und vorne abgestutzt, Punktierung auf der Scheibe fein und auf den Seiten wesentlich gröber. ♀ *tragoides*: Stirnleiste doppelt, Clypeus ebenfalls ausgerandet. Scheitel mit 2 kurzen Hörnern oder Tuberkeln. ♀ *triginus* n. sp. Stirnleiste einfach, Scheitel mit gerade Leiste. Punktierungsunterschied wie bei den ♂♂. Die verglichenen Stücke von *tragoides* sind aus der Sammlung Boucomont, Paris.